

# CS381: Numerical Computation & Softwares

## Root finding

Jakramate Bootkrajang

Department of Computer Science  
Chiang Mai University

- ในบทนี้เราจะศึกษาการหารากของสมการ
- สมการอาจเป็น
  - ▶ เชิงเส้น เช่น  $f(x) = ax + b$
  - ▶ ไม่เชิงเส้น เช่น  $f(x) = ax^2 + bx + c$
- คำว่ารากของสมการ (roots) หรือคำตอบของสมการก็คือ ค่า  $x^*$  ที่ทำให้  $f(x^*) = 0$

- หากสมการของเราเป็นสมการกำลังสอง  $f(x) = ax^2 + bx + c$
- เราทราบว่าสูตรลัดในการหารากทั้งหมดของสมการดังกล่าว

$$x_{1,2}^* = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- กรณีนี้โชคดีที่เราสามารถหา closed form formula ในการหาคำตอบได้
- ซึ่งสูตรลัดดังกล่าวมีไม่ครบทุกๆสมการ (อาจมีสำหรับกำลัง 3 และ 4) แต่หากกำลังมากกว่า 5 ก็จะไม่สูตรลัดมาช่วย
- ดังนั้นเราจึงต้องใช้วิธีทาง numerical มาช่วยประมาณค่ารากของสมการ

# Why do we care ?

- เราอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมเราจะต้องสนใจค่า  $x^*$  ที่ทำให้  $f(x) = 0$  ด้วย
- ก็เพราะว่าเราสามารถแปลงการหาค่าของฟังก์ชันให้ได้ค่าที่เราต้องการให้อยู่ในรูปแบบข้างต้น
- หากเราต้องการหา  $g(x) = 4$  เราสามารถมองปัญหาข้างบนในรูปแบบของ

$$g(x) - 4 = 0$$

$$f(x) = 0$$

- โดยที่เรานิยาม  $f(x) = g(x) - 4$
- ในการทำ optimisation เราอาจต้องการหา critical point หรือจุดที่  $f'(x) = 0$

# Problem statement

- กำหนดฟังก์ชัน  $f(x)$  เราต้องการจะหาค่า  $x$  ที่ทำให้สมการ  $f(x) = 0$  เป็นจริง
- สมการ  $f(x) = 0$  อาจไม่มีคำตอบ นั่นคือไม่มีค่า  $x$  ที่ทำให้สมการเป็นจริง
- แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่เราสนใจ เราสนใจแต่กรณีที่ สมการนั้นมีคำตอบ
- ในทางคณิตศาสตร์แล้วรากที่หาได้ อาจเป็นจำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อน แต่เราจะสนใจเฉพาะรากที่เป็นจำนวนจริง
- สมการบางสมการอาจมีรากมากกว่า 1 ตัว วิธีที่เราจะศึกษาจะไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีรากทั้งหมดกี่ตัว แต่จะหาให้เจอ 1 ในนั้นเท่านั้น

# Root finding algorithms

- อัลกอริทึมที่เราสนใจอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า iterative method
- คือการเริ่มจากการ “เดา” คำตอบเริ่มต้น แล้วค่อยๆปรับปรุงคำตอบไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ค่าที่พอใจ
- อัลกอริทึมที่เราจะศึกษาในบทนี้คือ
  - ▶ Bisection method
  - ▶ Newton's method
  - ▶ Secant method

## General guideline, where is the root?

- ก่อนจะเริ่มทำ เราจำเป็นจะต้องรู้คร่าวๆว่าเราจะหาคำตอบในช่วงไหน
- วิธีพื้นฐานคือการลองวาดกราฟของฟังก์ชัน แล้วดูช่วงที่น่าจะเจอคำตอบ (กราฟตัดกับแกน  $y$ )
  - ▶ การวาดกราฟอาจไม่ง่าย เมื่อมิติสูงขึ้นเรื่อยๆ
- วิธีที่สองอาจเป็นการหาจุด  $a, b$  ที่ซึ่ง  $f(a) > 0$  และ  $f(b) < 0$  ถ้าหาก  $f(x)$  เป็น continuous function เราจะได้ว่ารากของสมการจะต้องอยู่ในช่วง  $(a, b)$

# Bisection method





- เป็นวิธีที่เราน่าจะคิดถึงเป็นอันดับแรกในการเริ่มแก้ปัญหาค่ารหาคำรากของสมการ
- หลักการคือ เราพยายามจะหารากของฟังก์ชัน  $f(x)$  ซึ่งเป็น continuous function บนช่วง  $[a, b]$
- ที่ซึ่ง  $f(a) > 0$  และ  $f(b) < 0$
- เราทราบแน่นอนว่า จะต้องมามีค่าหนึ่งในช่วง  $[a, b]$  ที่ทำให้  $f() = 0$
- วิธี Bisection method จะเจอค่านี้ในที่สุด

- อันดับแรก เราแบ่งช่วง  $[a, b]$  ออกเป็นสองช่วงที่จุด  $c = \frac{a+b}{2}$
- ซึ่งจะได้ช่วงสองช่วงใหม่คือ  $[a, c]$  และ  $[c, b]$
- เราจะเลือกเก็บช่วง  $[a, c]$  ไว้ หาก  $f(a)f(c) < 0$  ไม่เช่นนั้นก็เก็บ ช่วง  $[c, b]$  ไว้
- แล้วทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้  $f(c) \approx 0$

# Bisection

สอง iteration แรกของ bisection method



# Convergence of Bisection method

- กำหนดให้  $r$  คือคำตอบของสมการ
- นิยาม  $|r - c_n|$  เป็นความคลาดเคลื่อน (หรือ error) ของค่าประมาณคำตอบที่ iteration  $n$
- เราจะได้ว่า rate of convergence ของ Bisection method เป็น linear

$$|r - c_n| \leq 2^{-(n+1)}(b_0 - a_0)$$

- นั่นคือ  $c_n$  ที่ได้จาก Bisection method จะเข้าใกล้คำตอบด้วย rate เท่ากับ  $\frac{1}{2}$


# Newton's method

# Newton's method


- Newton's method เป็นวิธี iterative method ในการหาค่าของสมการที่นิยมใช้กันมาก
- มีหลักการปรับปรุงคำตอบโดยการประมาณฟังก์ชัน  $f(x)$  ที่ต้องการหาค่าด้วยฟังก์ชันเชิงเส้น  $l(x)$
- แล้วใช้รากของฟังก์ชันเชิงเส้นดังกล่าว เป็นค่าประมาณรากของ  $f(x)$  ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

# The construction

- สมมติฟังก์ชัน  $f(x)$  ที่มีคำตอบเป็น  $r$ .
- เริ่มต้นเดาค่าของคำตอบด้วย  $x_0$



# The construction




- ให้  $l(x)$  แทนเส้นตรงที่สัมผัส  $f(x)$  ที่จุด  $x_0$  และตัดแกน  $x$  ที่จุด  $x_1$



# The construction

- สมการเส้นตรง  $l(x)$  สามารถหาได้โดยใช้จุดสองจุดบนเส้นตรงดังกล่าว (จุดเขียวสองจุดมี co-ordinate เป็นเท่าไร ?)
- พื้นความจำ การสร้างสมการเส้นตรงจากจุดสองจุด  $(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1) = m$



# The construction

- รวบรวมข้อมูล จุดสี่เหลี่ยม(บน)  $(x_0, f(x_0))$  จุดสี่เหลี่ยม(ล่าง)  $(x_1, 0)$
- ได้สมการเส้นตรงเป็น

$$\frac{0 - f(x_0)}{(x_1 - x_0)} = m$$

$$0 - f(x_0) = f'(x_0)(x_1 - x_0)$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

- ทั้งนี้ให้  $f'(x_0)$  แทนความชัน  $m$  ของเส้นตรงนี้
- จากสมการข้างต้นเราได้สมการที่แสดงค่า  $x_1$  ในรูปของ ค่าประมาณคำตอบเดิม  $x_0$  ค่าฟังก์ชัน ณ ตำแหน่งคำตอบเดิม และค่าความชัน ณ ตำแหน่งคำตอบเดิม

# The construction

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

- ค่า  $x_1$  มีความน่าสนใจคือ ค่าของมันเข้าใกล้  $r$  มากกว่า  $x_0$  (สังเกตจาก graph)
- หากเราใช้  $x_1$  เพื่อหาเส้นตรงที่สัมผัส  $f(x)$  ที่จุด  $x_1$  อีก เราจะได้  $x_2$  ที่เข้าใกล้คำตอบ  $r$  มากขึ้น


$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

- และทำซ้ำลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้  $x_n$  ที่  $f(x_n) \approx 0$ .
- จากสมการข้างต้นทำให้เรา สรุปรูปแบบการปรับปรุงค่าประมาณคำตอบของ Newton's method (Newton-Raphson method) ได้ว่า

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

# Newton iterations

สอง iteration แรกของ Newton method



# Newton does not always converge




Figure 2.4: Newton's method does not always converge. In this case, the starting point is a fixed point of Newton's method iterated twice

หมายเหตุ Fixed point คือจุดที่  $x = f(x)$

# Convergence of Newton's method

- กำหนดให้  $e_n$  คือค่า error ใน iteration ที่  $n$
- ทฤษฎีกล่าวไว้ว่า rate of convergence ของ Newton's method เป็น quadratic

$$e_{n+1} \approx ce_n^2$$

## Secant method



- เราทราบแล้วว่า Newton's method มีหลักในการปรับปรุงค่าประมาณของคำตอบโดย

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

- ถ้าหากในกรณีที่เราไม่สามารถหาอนุพันธ์ของ  $f$  ได้ (อาจหาไม่ได้ หรือซับซ้อนเกินไป) เราก็จะไม่สามารถใช้ Newton's method ได้
- แต่เราอาจแก้ปัญหาโดยประมาณค่า  $f'(x)$  แทน โดยวิธี

$$f'(x) \approx \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$$

# The secant method


- ทำให้เราได้วิธีที่เรียกว่า Secant method

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

- สังเกตว่าหากใช้วิธี Secant method เราจะต้องเดาค่าเริ่มต้นสองจุด

# Secant iterations

$x_{n+1}$  ถูกประมาณโดยใช้  $x_n$  และ  $x_{n-1}$



# Convergence of Secant method

- กำหนดให้ความคลาดเคลื่อนของคำตอบ ที่ n-th iteration เป็น

$$e_n = x_n - r$$

- ทฤษฎีกล่าวไว้ว่า rate of convergence ของ secant method เป็น **superlinear** (เร็วกว่า linear แต่ช้ากว่า quadratic), นั่นคือ

$$e_{n+1} \approx |e_n|^\alpha \quad \text{โดยที่} \quad \alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

- Introduction to numerical analysis by Doron Levy (บทที่ 2)